

引產須知

簡介

引產 (俗稱「催生」) 是指在孕婦未有作產徵狀時，以人工方法引發進入產程，方法包括透過前列腺素藥物軟化宮頸 (PGE2 / Propess)、羊膜穿刺術 (人工穿胎水) 或使用催產素生藥物 (Syntocinon) 引發子宮收縮。

引產原因：_____

程序

1. 醫生會根據孕婦的妊娠週數、胎兒位置及宮頸成熟度，選擇合適的引產方法。
2. 若孕婦宮頸成熟度不足，會經陰道放入前列腺素 (PGE2 / Propess) 使宮頸軟化，逐漸引發宮縮，令宮頸張開。
3. 若孕婦宮頸已經成熟，會作羊膜穿刺術 (人工穿胎水)，按需要將催產素 (Syntocinon) 經由靜脈滴注，以刺激宮縮。
4. 整個引產過程需時，期間醫護會密切監察孕婦宮縮、胎心率和產程進展。
5. 約 80% 接受引產的孕婦，可以成功經陰道分娩。若引產失敗，醫生會作出評估，施行剖腹產。

風險 / 併發症

1. 引致宮縮過度頻密，可能造成胎兒宮內窘迫或胎兒缺氧
2. 胎膜穿破時間過長，有機會引起子宮內受感染
3. 增加儀器助產及剖腹產風險
4. 引產失敗，需要施行剖腹產
5. 子宮破裂，特別是曾生育的孕婦
6. 臍帶脫垂
7. 羊水栓塞

備註

此表僅列一般信息，不可預計的併發症偶有發生，各類孕婦的風險程度亦為不同，故上述風險／併發症不能盡錄。如有查詢，請聯絡您的產科醫生。

本人確認以上有關我／孕婦將要接受手術／程序／治療的資料，並已閱讀及完全明白其內容，醫生／醫護人員已向我作了解釋及我收到有關此項手術醫療程序／治療的資料單張。

孕婦簽署

家屬／監護人簽署

日期 (日-月-年)

家屬／監護人姓名

家屬／監護人身分證明號碼

關係

